تنوع الطيور في بعض الأراضي الرطبة بمدينة بنغازي ليبيا

مجدولين الفقي^{1*}، عبد الناصر عيسى^{2,4}، هدي الحداد^{2,5}، زكريا محمد أبو منجي¹، وخالد التائب^{3,2}

ARTICLE INFO

Vol. No. 7 April, 2025

Pages A-(1 - 11)

Article history:

Received 30 January 2025
Accepted 14 February 2025

Authors affiliation

1. Ministry of Water Resources, Libya.
2. Libyan Society for Bird.
3. Department of Zoology, Faculty of Science, University of Tripoli.
4. Department of Biology, Faculty of Education, Esbi'a, University of Al-Jfara.
5. Department of Natural Resources, Faculty of Environmental Sciences - Al- Marj, University of Benghazi.

lyna33185@gmail.com

Ab.issa@uot.edu.ly

alhaddadhudi@gmail.com

eng.zakaria.m@gmail.com

khaledetayeb@yahoo.com

Keywords: Birds, Wetlands, Diversity, Abundance, Benghazi.

© 2025

Content on this article is an open access licensed under creative commons CC BY-NC 4.0.

المخلص

تميز ليبيا بتنوع كبير في الأراضي الرطبة، وبشكل عام فإن معظم الأراضي الرطبة في ليبيا تكون على هيئة أحواض ضحلة جداً أو مالحة أو مفتوحة، تكون جافة أو شبه جافة معظم فترات السنة وأحياناً تكون متصلة بالبحر (سبخات)، أغلبها تجذب الأنواع المختلفة من الطيور. هدفت هذه الدراسة إلى تصنيف مناطق الدراسة وفقاً لمعايير اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة والتعرف على أنواع الطيور التي تتراد المناطق في المواسم وكذلك تحديد حالة الأنواع من حيث التهديد بالانقراض. أقيمت هذه الدراسة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، وتضمنت ثلاثة مناطق رطبة (بحيرة 23 يوليو وبحيرة جليانة وسبخة قنفوذة) في مدينة بنغازي. أتضح أن بحيرة جليانة وبحيرة 23 يوليو تصنفان تحت النوع J: البحيرات الساحلية المالحة، أما سبخة قنفوذة تصنف ضمن النوع R: البحيرات والمسطحات الموسمية المالحة. سجلت هذه الدراسة ما مجموعه 47680 فرد من الطيور، تنتمي إلى 96 نوع منها 67 مائي، و29 نوع غير مائي. وتميزت بحيرة جليانة بأنها الأعلى تنوعاً مقارنة ببقية مناطق الدراسة، أما منطقة قنفوذة فكانت الأعلى وفرةً. سجلت هذه الدراسة فوقاً معنوية بين أعداد أنواع الطيور بين فصول السنة بمناطق الدراسة، حيث كان فصل الخريف الأعلى تنوعاً، أما الأقل تنوعاً فكان فصل الشتاء. كما تم خلال هذه الدراسة تسجيل ما مجموعه واحد وعشرون نوعاً مهدداً بالانقراض.

Bird Diversity in Some Wetlands of Benghazi, Libya

Magdolin Alfaghi, Abdunasser Eisa, Hudi Alhaddad, Zakaria Aboumonji, Khaled Etayeb.

Libya is characterized by a great diversity of wetlands, in general, most of the wetlands in Libya are in the form of very shallow, saline or open basins, which are dry or semi-dry most of the year and sometimes connected to the sea (sabkhas), most of which attract different species of birds. This study aimed to classify the study areas according to the criteria of the Ramsar Convention on Wetlands and to identify the bird species that existed in the areas during the seasons, as well as to determine the status of the species in terms of threatening. This study was conducted during the period from January to December 2023, included three wetlands (July 23 Lake, Julyana Lake and Qanfudah Sabkha) in the city of Benghazi. It was found that Julyana Lake and July 23 Lake are classified under type J: coastal salt lakes, while Qanfudah Sabkha is classified under type R: seasonal salt lakes and flats. This study recorded a total of 47,680 birds belonging to 96 species, 67 of which were aquatic and 29 non-aquatic. Julyana lake was distinguished as the highest diversity compared to the rest of the study areas, while Qanfudha area was the highest in abundance. This study recorded significant differences in the numbers of bird species between the seasons of the year in the study areas, where fall season was the highest in diversity, while winter was the least diverse. During this study, a total of twenty- one endangered species were recorded.

المقدمة

منطقة قنفوذه:

سبخة قنفوذه هي منطقة رطبة سبخة ساحلية، تقع في غرب المدينة وتبعد 800 م تقريباً من شاطئ البحر شرقاً $20^{\circ}03.218' - 32^{\circ}06.087'$ شمالاً، مجاوره للمكب نفايات كبير وقد تم ردم جزء منه والبناء فوقه، تستقطب العديد من الطيور ويوجد بها تنوع للطيور البحرية المهاجرة، ومصدر المياه للمنطقة في الوضع الراهن يعتمد على مياه الأمطار، والغطاء النباتي الذي تحويه المنطقة فريد في تحمل درجات الملوحة العالية، حيث كان الموقع في الماضي مصنع للملح الصناعي.

بحيرة 23 يوليو (بحيرة بنغازي):

تقع في وسط مدينة بنغازي شرقاً $20^{\circ}3'50.04'$ ، $32^{\circ}6'15.12'$ شمالاً وهي من أبرز معالم المدينة وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق قناة صغيرة مع ميناء بنغازي يبلغ عرضها 120 متراً، يمر فوقها كوبري جليانه الذي يصل بين بنغازي المدينة وجليانه تبلغ مساحة البحيرة مائة هكتار في حين أن عمقها يصل في حده الأقصى إلى 5 أمتار بينما أدنى عمق لها إلى 2.5 متر تقريباً.

شكل رقم (1): مناطق الدراسة.

الأدوات المستخدمة في الدراسة:

1. كاميرا نوع (Sony DSC-HX400V).
2. المكبر Opticon binoculars بقوة تكبير 50X10.
3. المنظار (تليسكوب) Kite 20 X 60.
4. كتاب الدليل المحلي للطيور (Svensson *et al.*, 2009).

الزيارات الحقلية:

أقيمت هذه الدراسة خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023، وتضمنت الدراسة زيارات حقلية موسمية خلال كافة الفصول، وتضمنت ثلاثة مناطق رطبة: بحيرة 23 يوليو وبحيرة جليانه وسبخة قنفوذه في مدينة بنغازي، حيث كان عدد الزيارات 60 زيارة تقريباً للمناطق الثلاثة من الصباح الباكر حتى منتصف النهار. تم تعداد الطيور بطريقة النقطة المقطعية Point Transect تم فيها حصر وتسجيل أنواع وأعداد الطيور.

المؤشرات البيئية:

- مؤشر شانون ويفر للتنوع (Shannon-Weaver (H'))
- مؤشر سمبسون للسيادة (Simpson index (D))
- مخطط فان دايقرام Venn Diagram

تطل ليبيا على البحر المتوسط بساحل يمتد لحوالي 2000 كيلومتر، ويختر مجموعة متنوعة من النظم البيئية، وتتميز معظم هذه البيئات بالتنوع البيولوجي وترتادها الطيور المهاجرة بنسب متفاوتة، ويضم العديد من المناطق الرطبة التي توفر الظروف المناسبة مثل: المأوي والغذاء للعديد من أنواع الطيور، والمناخ المتميز بالتباين في درجات الحرارة من حيث الارتفاع والانخفاض، مما يساعد على النمو والتكاثر لكافة الكائنات التي ترتادها، وعلى وجه العموم فإن المناطق الرطبة تعتبر من أفضل البيئات للطيور المقيمة والمهاجرة، وخاصة الطيور المائية (Defos *et al.*, 2001).

تنوع الأراضي الرطبة في ليبيا، فمنها واحات صحراوية، وينابيع مياه عذبة أو مالحة، أو خزانات صناعية، وبشكل عام فإن معظم الأراضي الرطبة في ليبيا تكون على هيئة أحواض ضحلة جداً أو مالحة أو مفتوحة، تكون جافة أو شبه جافة معظم فترات السنة وأحياناً تكون متصلة بالبحر (سبخات)، أغلبها تجذب الأنواع المختلفة من الطيور المائية خصوصاً في فصل الشتاء مع ارتفاع منسوب المياه (EGA-RAC/SPA, 2012)، وهنا تجدر الإشارة إلى التعداد الشتوي للطيور المائية والذي يقام في أغلب دول العالم خلال شهر يناير من كل سنة تحت إشراف المنظمة الدولية للمناطق الرطبة (International Wetland) حيث بدأ في ليبيا سنة 2005 واستمر حتى السنة 2023 ويتم خلاله تغطية كافة المناطق الرطبة في ليبيا وتعداد الطيور التي ترتادها.

يؤثر تدهور الأراضي الرطبة على وفرة أعداد الطيور وخدمات النظام البيئي، ومن هنا تأتي أهمية الرصد (Samraoui *et al.*, 2011) تعتبر ليبيا من الدول التي تناولت دراسات الطيور مؤخراً مقارنة بالدول المجاورة لها (Smart *et al.*, 2006)، ونظراً لقلّة الدراسات المستفيضة عن الطيور بالأراضي الرطبة في ليبيا عامة وبمنطقة بنغازي خاصة والتي كانت تقتصر على التعداد الشتوي للطيور المائية، فإن هذه الدراسة تناولت الطيور ببعض الأراضي الرطبة بمدينة بنغازي على مدى فصول السنة كاملة.

وتهدف هذه الدراسة إلى:

1. تصنيف مناطق الدراسة وفقاً لمعايير اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة.
2. التعرف على أنواع الطيور التي ترتاد المناطق بكافة المواسم.
3. تحديد حالة الأنواع من حيث التهديد بالانقراض وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN-Red list) والملحق الثاني الصادر عن مركز الأنشطة الإقليمية للأنواع المتمتع بحماية خاصة (RAC/CPA-Annex II).

المواد والطرق:

أجريت الدراسة الحقلية في مدينة بنغازي وهي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا وتطل على ساحل البحر المتوسط، شملت الدراسة ثلاثة مناطق وهي: بحيرة جليانه، منطقة قنفوذه (سبخة)، بحيرة بنغازي (23 يوليو) (شكل 1).

منطقة جليانه:

بحيرة جليانه تقع في نطاق مدينة بنغازي، في مركز المدينة السياحي يحدها من الشمال بحيرة 23 يوليو ومن الشرق طريق العروبة ومن الجنوب الطريق الدائري الثاني ومن بعده منطقة طابليو، ومن الغرب شارع الجزائر. واقصى امتدادات لها تقع بين خطي طول $20.050418^{\circ} - 20.063580^{\circ}$ شرقاً، ودائرتي عرض $32.082258^{\circ} - 32.099059^{\circ}$ شمالاً.

النتائج والمناقشة:

أ. النتائج:

تصنيف منطقة الدراسة:

من خلال نتائج الدراسة ووفقاً لتصنيف ومعايير اتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة يتضح أن بحيرة جليانه وبحيرة 23 يوليو تصنفان تحت النوع J: البحيرات الساحلية المالحة، أما سبخة قنفوذة تصنف ضمن النوع R: البحيرات والمستطحات الموسمية المالحة.

تنوع ووفرة الطيور:

أظهرت نتائج هذه الدراسة انه تم رصد وتسجيل ما مجموعه 47680 فرد من إجمالي النتائج المتحصل عليها من الطيور، تنتمي إلى 96 نوع منها 67 مائي، و29 نوع غير مائي، تتبع 34 فصيلة، و16 رتبة على التوالي (جدول 1)، وكان هناك تباين في التنوع والوفرة بين المناطق ومن خلال عدد الأنواع التي تم رصدها وتصنيفها أوضحت النتائج أن رتبة الزقراقيات (Charadriiformes) كانت أكبر الرتب تنوعاً حيث بلغ عدد أنواعها 41 نوع، تليها بعد ذلك رتبة الجواثم (Passeriformes) ممثلة في 18 نوع، بينما كانت هناك 6 رتب متمثلة بنوع واحد فقط، ووفقاً للنتائج تعد فصيلة الكروانيات (Scolopacidae) الأكبر تسجيلاً، حيث بلغ عدد الأنواع بها 18 نوع، تليها ثلاثة فصائل: فصيلة النورسيات (Laridae)، وفصيلة البطيات (Anatidae) وفصيلة الخرشانيات (Sternidae) وكل فصيلة ممثلة في 8 أنواع، كما أن هناك 20 فصيلة ممثلة بنوع واحد فقط (جدول 1)، وتميزت بحيرة جليانه بأنها الأعلى تنوعاً مقارنة ببقية مناطق الدراسة (شكل 2)، أما منطقة قنفوذة فكانت أعلى ووفرة واستقطاباً للطيور مع وجود عدد محدود من الأنواع (شكل 3).

تفاوت أعداد الأنواع التي سجلت خلال فصول السنة الدراسية فكان فصل الخريف الأعلى تنوعاً، حيث بلغ إجمالي عدد الأنواع 83 نوعاً، وكانت أغلبها من رتبة الزقراقيات (Charadriiformes)، رتبة الإوزيات (Anseriformes)، ورتبة البجعيات (Pelecaniformes)، أما الفصل الأقل تنوعاً فكان فصل الشتاء حيث بلغ عدد الأنواع به 46 نوعاً فقط (شكل 4).

جدول رقم (1): الرتب والفصائل والأنواع المسجلة بمناطق الدراسة.

الرتبة	الفصيلة	النوع (الاسم العلمي)	النوع (الاسم الشائع)	النوع (الاسم العربي)	جليانه	قنفوذة	23 يوليو
Anseriformes	Anatidae	<i>Mareca strepera</i>	Gadwall	بط سماري	1	-	-
		<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	بليول شمالي	6	-	-
		<i>Anas crecca</i>	Eurasian Teal	حذف شتوي	7	-	-
		<i>Spatula clypeata</i>	Northern Shoveler	بط أبو مجرف	4	-	-
		<i>Spatula querquedula</i>	Garganey	حذف صيفي	2	-	-
		<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marbled Teal	حذف رخامي	1	-	-
		<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	حمرأوي شائع	1	-	-
		<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	حمرأوي أبيض العين	2	-	-
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	غراب الماء الكبير	1	-	13
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe	غطاس أسود الرقبة	15	-	-
		<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	غطاس صغير	230	-	1
		<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	غطاس متوج كبير	5	-	-
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	بلشون الماشية	120	265	22
		<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	بلشون أبيض صغير	205	-	10

		<i>Ardea alba</i>	Great White Egret	بلشون أبيض كبير	-	-	1
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-heron	بلشون ليل أسود التاج	4	-	-
		<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron	بلشون ذهبي	24	-	-
		<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	بلشون رمادي	75	22	-
		<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	بلشون أرجواني	2	-	-
	Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	أبو منجل اللامع	7	-	-
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Greater Flamingo	النحام الوردي الكبير	5	14	-
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	عقاب نساري	1	-	-
	Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh-harrier	مرزة المستنقعات	4	-	-
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet	نكات أبقع	3	-	-
		<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	أبو المغازل	85	-	-
	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	قطقاط مطوق صغير	4	-	-
		<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover	قطقاط مطوق شائع	92	16	-
		<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Kentish Plover	قطقاط إسكندراني	175	172	-
		<i>Pluvialis apricaria</i>	Eurasian Golden Plover	قطقاط ذهبي	1	-	-
		<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	قطقاط رمادي	1	-	-
	Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	درججة حمراء	6	-	-
		<i>Calidris alba</i>	Sanderling	درججة بيضاء	36	-	-
		<i>Calidris pugnax</i>	Ruff	الحجالة	6	-	-
		<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	درججة متغيرة	36	373	-
		<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	درججة كروانية	25	43	-
		<i>Calidris minuta</i>	Little Stint	درججة صغيرة	125	80	-
		<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone	قنبرة الماء	8	-	-
		<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	طيطوي شائع	60	-	1
		<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	طيطوي الغياض	2	-	-
		<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	طيطوي أخضر	16	-	-
		<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	طيطوي أحمر الساق	19	51	-
		<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	طيطوي أحمر الساق أرقط	5	-	-
		<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	طيطوي أخضر الساق	4	-	-
		<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	طيطوي المستنقعات	2	-	-
		<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	بقويقة سوداء الذيل	1	-	-
	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	كروان الماء	6	6	-	
	<i>Numenius phaeopus</i>	Eurasian whimbrel	كروان الماء الصغير	1	-	-	
	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	شبق شائع	2	-	-	
	Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Black-headed Gull	نورس أسود الرأس	1012	1095	1300
		<i>Chroicocephalus genei</i>	Slender-billed Gull	نورس مستدق المنقار	184	1	-
		<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull	نورس أصفر الساقين	22	733	2
		<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull	نورس أسود الظهر كبير	1	9	-
		<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull	نورس أسود الظهر صغير	411	1309	15
		<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Audouin's Gull	نورس أدوين	1	-	-
		<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Mediterranean Gull	نورس البحر الأبيض المتوسط	2	-	-
<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>		Pallas's Gull	نورس أسود الرأس كبير	1	-	-	

	Sternidae	<i>Sternula albifrons</i>	Little Tern	خرشنة صغيرة	5	-	-
		<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sandwich Tern	خرشنة ساندويتش	25	-	3
		<i>Thalasseus bengalensis</i>	Lesser Crested Tern	خرشنة متوجة صغيرة	255	-	-
		<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern	خرشنة نورسية المنقار	2	1	4
		<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	خرشنة شائعة	10	-	-
		<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern	خرشنة قزوينية	37	-	-
		<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern	خرشنة سوداء	116	-	2
		<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern	خرشنة هجينة	4	-	-
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen	دجاجة الماء	22	-	1
		<i>Fulica atra</i>	Common Coot	غراء أوراسية	12	-	-
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	صياد السمك الشائع	13	-	-
	Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	European Bee-eater	وروار أوروبي	1	-	-
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	سنونو المخازن	150	12	20
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	دوري منزلي	2500	200	50
	Fringillinae	<i>Serinus serinus</i>	European Serin	الثغر الأوروبي	1	-	-
	Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	الزرزور الشائع	5000	29500	250
	Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Eurasian Golden Oriole	صغير ذهبي	2	-	-
	Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Iberian grey shrike	صرد رمادي	1	1	-
	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff	نقشارة شائعة	61	-	-
	Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat	قلبي احمر	1	-	-
		<i>Saxicola rubicola</i>	Common Stonechat	قلبي مطوق	6	-	-
		<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear	ابلق شمالي	3	-	-
		<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Common Redstart	حمراء شائعة	1	-	-
	Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Western Yellow Wagtail	الأعزة الصفراء	6	-	-
		<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	الأعزة البيضاء	88	60	-
		<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	جشنة الشجر	1	-	-
	Alaudidae	<i>Ammomanes deserti</i>	Desert Lark	قنبرة الصحراء	4	-	-
		<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark	قنبرة متوجة	11	1	-
Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Eurasian Blackbird	الشحور	1	1	-	
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Eurasian Blackcap	أبو قننوسة	1	-	-	
Bucerotiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Common Hoopoe	الهدهد الأوراسي	1	-	1
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i>	Common Swift	سمامة شائعة	22	-	-
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Little Owl	بومة صغيرة	1	-	-
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	عوسق شائع	-	1	-
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo rufinus</i>	Long-legged Buzzard	حوام طويل الساقين	1	-	-
		<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Buzzard	حوام خشن الساقين	-	1	-
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Rock Dove	الحمام الجبلي	19	500	20
		<i>Spilopelia senegalensis</i>	Laughing Dove	اليمام الضاحك	1	-	-
		<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared-dove	اليمام المطوق	1	11	-
		<i>Streptopelia turtur</i>	European Turtle-dove	القمرى الأوروبي	2	21	-

شكل رقم (5): وفرة الطيور خلال فصول الدراسة.

شكل رقم (2): تنوع الطيور بمناطق الدراسة.

شكل رقم (6): تنوع الطيور بمناطق الدراسة خلال فصول الدراسة.

شكل رقم (3): وفرة الطيور بمناطق الدراسة.

شكل رقم (7): وفرة الطيور بمناطق الدراسة خلال فصول الدراسة.

شكل رقم (4): تنوع الطيور خلال فصول الدراسة.

شكل رقم (8): مخطط فان (Venn Diagram) بين مناطق الدراسة.

كذلك عند استخدام هذا المخطط بين فصول الدراسة اتضح أنه اشترك كل الفصول في 26 نوع، وانفرد فصل الخريف بعدد 17 نوع، وكانت القيمة الأعلى، وأقل قيمة بين الفصول انفرد بها فصل الشتاء هي 7 أنواع (شكل 9).

شكل رقم (9): مخطط فان (Venn Diagram) بين فصول الدراسة.

الأنواع المهددة بالانقراض:

خلال هذه الدراسة تم تسجيل ما مجموعه 21 نوع مهددا بالانقراض وذلك وفق القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN-Red list)، والملحق الثاني الصادر عن مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمنعة بحماية خاصة (RAC/CPA-Annex II) وحالات التهديد التي وجدت تمثلت في مهدد وقريب من التهديد ومعرض للتهديد (NT، T) و (VU) على التوالي (جدول 4).

المؤشرات البيئية:

تم حساب المؤشرات البيئية للمناطق المدروسة، وكانت النتائج على النحو التالي:

مؤشر شانون (H') أن المنطقة الأعلى تنوعاً هي منطقة جليانه، حيث بلغت قيمة مؤشر شانون 2.10، ثم يليها منطقة 23 يوليو حيث كانت قيمته 0.925، والأقل تنوعاً بين المناطق منطقة قنفودة حيث بلغت قيمة المؤشر 0.751 (جدول 2). أما بالنسبة لمؤشر سمبسون (D) للسيادة فكانت قيمت المؤشر في منطقة جليانه 0.750، أما قيمته في منطقة 23 يوليو فكانت 0.403، أما القيمة الأقل لهذا المؤشر فقد سجلت في منطقة قنفودة وكانت 0.266 (جدول 2).

جدول رقم (2): المؤشرات البيئية في مناطق الدراسة.

المؤشر	منطقة جليانه	منطقة قنفودة	منطقة 23 يوليو
Shannon_H'	2.10	0.723	0.925
Simpson_1-D	0.750	0.266	0.403

من خلال استخدام المؤشرات البيئية بين فصول السنة، أوضحت نتائج مؤشر شانون أن الفصل الأعلى تنوعاً هو فصل الخريف، والذي بلغت قيمته 3.17، يليه فصل الصيف حيث بلغت قيمة هذا المؤشر 3، ثم فصل الربيع بقيمة 1.27، ويعتبر فصل الشتاء الأقل تنوعاً من بين كل الفصول، حيث كانت القيمة 0.976 (جدول 3). أما بالنسبة لمؤشر سمبسون للسيادة فكانت أيضاً قيم كل من فصلي الخريف والصيف متقاربة جداً (0.931 و 0.928 على التوالي) أما القيمة الأقل لهذا المؤشر فقد سجلت خلال فصل الشتاء وكانت 0.380 (جدول 3).

جدول رقم (3): المؤشرات البيئية في فصول الدراسة.

المؤشر	فصل الشتاء	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف
Shannon_H'	0.976	1.27	3	3.17
Simpson_1-D	0.380	0.564	0.928	0.931

مخطط فان Venn Diagram:

باستخدام هذا المخطط بين المناطق، اتضح أن الأنواع التي تنفرد بها منطقة جليانه هي الأعلى حيث بلغت 61 نوع، وتشترك المناطق الثلاثة في 9 أنواع، تليها منطقة قنفودة حيث تشترك مع منطقة جليانه في 16 نوع، ومنطقة 23 يوليو تشترك مع منطقة جليانه في عدد 7 أنواع (شكل 8).

جدول رقم (4): أنواع الطيور المهددة بالانقراض التي

الرقم	الاسم العربي	الاسم الشائع	الاسم العلمي	الحالة	المصدر
1	حذف رخامي	Marbled teal	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	NT	IUCN RED LIST
2	حمراوي شائع	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	VU	IUCN RED LIST
3	حمراوي أبيض العين	Ferruginous duck	<i>Aythya nyroca</i>	NT	IUCN RED LIST
4	عقاب نساري	Ospery	<i>Pandion haliaetus</i>	T	RAC-SPA

RAC-SPA	T	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Kentish plover	قطقاط إسكندري	5
IUCN RED LIST	VU	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey plover	قطقاط رمادي	6
IUCN RED LIST	NT	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	درججة حمراء	7
IUCN RED LIST	VU	<i>Arenaria interpre</i>	Ruddy Turnstone	قنبرة الماء	8
IUCN RED LIST	NT	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	درججة متغيرة	9
IUCN RED LIST	VU	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew sandpiper	درججة كروانية	10
IUCN RED LIST	NT	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed godwit	بقويقة سوداء الذيل	11
IUCN RED LIST	NT	<i>Numenius Arquata</i>	Eurasian Curlew	كروان الماء	12
RAC-SPA	T	<i>Chroicocephalus genei</i>	Slender-Billed gull	نورس مستدق المنقار	13
RAC-SPA	T	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Mediterranean gull	نورس البحر المتوسط	14
RAC-SPA, IUCN RED LIST	VU	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Audouin's gull	نورس أدوين	15
RAC-SPA	T	<i>Sternula albifrons</i>	Little tern	خرشنة صغيرة	16
RAC-SPA	T	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sandwich tern	خرشنة ساندويتش	17
RAC-SPA	T	<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian tern	خرشنة قزوينية	18
RAC-SPA	T	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Lesser Crested tern	الخرشنة المتوجة	19
IUCN RED LIST	VU	<i>Lanius meridionalis</i>	Iberian grey shrike	صرد رمادي	20
IUCN RED LIST	VU	<i>Sterptopelia turtur</i>	European Turtle-dove	القمرى الأوروبي	21

التي تناولت المنطقة من حيث تنوع الطيور وكأرض رطبة في بيئة عمرانية (Gaskell, 2005; Smart *et al.*, 2006; EGA-RAC/SPA, 2012; Elbabour, 2018, Etayeb *et al.*, 2023)

بالنسبة لمنطقة قنفوذة فهي عبارة عن سبخة وتم استغلالها كمكب للنفايات، ومن الطبيعي أن تكون الوفرة أكثر من حيث عدد الأنواع وأنواع الطيور القمامة، أيضاً العامل المهم الذي يفسر كثرة النوارس بأعداد كبيرة هو وجود مكبات النفايات في بعض السبخات، وهذا يجذب أعداد كبيرة من النوارس تصل الي عشرات الآلاف لأن هذه الأنواع هي في الأساس قمامة وتفضل مدافن النفايات القابلة للتعفن، حيث تشكل القمامة جزءاً كبيراً من النظام الغذائي للطيور النورسية (Weiser and Powell., 2011). ونظراً لجفاف المنطقة وعدم توفر المياه الدائمة فيها في بعض أوقات السنة، فربما أثر ذلك على قلة التنوع الكبير فيها واختفاء الطيور بقية الفصول وبالرغم من ذلك فقد سجل تواجد النوارس بتنوع ووفرة كبيرين أثناء موسم الهجرة وخصوصاً خلال المسح الشتوي (Smart *et al.*, 2006; EGA-RAC/SPA, 2012; Etayeb *et al.*, 2023)

منطقة 23 يوليو في طبيعتها عبارة عن مياه عميقة ولذلك التنوع لم يكن كبير، لأن عمق المياه يعتبر عامل محدد لأنواع الطيور المائية ويقتصر على تلك التي تجيد السباحة والغوص للوصول إلى موارد الغذاء المتاحة، لأنه يجد من وصول بعض أنواع الطيور إليها (Baker, 1979; Poysa, 1983)، ولذلك فإن أكثر أنواع الطيور الموجودة فيها الغواصات والنوارس والتي لها القدرة على السباحة وهذا يتوافق مع نتائج المسح الشتوي للطيور المائية-EGA (RAC/SPA, 2012)

من خلال فصول الدراسة اتضح أن فصل الخريف الأكثر تنوعاً وهذا ربما يفسر بأنه موسم الهجرة الذي تصل فيه أعداد الأنواع إلى الذروة، والأقل تنوعاً كان فصل الشتاء لأن أغلب الأنواع

ب. المناقشة:

من خلال نتائج هذه الدراسة التي أقيمت في الفترة من شهر يناير 2023 إلى نوفمبر 2023 أتضح أن تصنيف مناطق الدراسة وفقاً لمعايير اتفاقية رامسار (Ramsar) لحماية الأراضي الرطبة أن بحيرة جليانه وبحيرة 23 يوليو تصنفان تحت النوع J: البحيرات الساحلية المالحة، أما سبخة قنفوذة تصنف ضمن النوع R: البحيرات والمستطحات الموسمية المالحة، وصنفت كسبخة مالحة متصلة بمنفذ مع البحر، وهي من البحيرات المالحة الموسمية التي تجف أو تبقى رطبة في بعض الأوقات من السنة (RAMSAR.org, 2024; EGA-RAC/SPA, 2012)

وهذا التصنيف يعتبر مرجعية عالمية يعتمد عليها في معرفة وتصنيف الأراضي الرطبة وأن الاتفاقية لم تحمل أي نوع من أنواع الأراضي الرطبة بما فيها الصناعية (RAMSAR.org, 2024).

من خلال نتائج هذه الدراسة وأعداد الأنواع التي سجلت في مناطق الدراسة والوفرة العديدة للأفراد يتضح جلياً أن المنطقة مهمة وتستقطب أعداد جيدة من الطيور المهاجرة، كذلك تأوي العديد من الطيور المقيمة (Gaskell, 2005; Azafzaf *et al.*, 2005, 2006; Smart *et al.*, 2006; Etayeb *et al.*, 2007; EGA-RAC/SPA, 2012; Bourass *et al.*, 2013; Etayeb *et al.*, 2023).

بحيرة جليانه كانت الأكثر تنوعاً بسبب نظامها البيئي الفريد وبيئاتها المختلفة، هناك أنواع مختلفة من البيئات في منطقة البحيرة (مسطح مائي، سبخة وغطاء نباتي كثيف)، ولكل نظام خصائصه البيئية المختلفة، والتي تنعكس باختلافات في نوعية التربة والنباتات والحيوانات بمختلف أنواعها. كما تحتوي على مجموعة متنوعة من الأعشاب والنباتات المائية والبرية التي تعمل على جذب الطيور وتسهيل اختفائها، كما تتميز بموقعها حيث تتوسط المدينة بعيداً عن الإزعاج، أيضاً هناك انتشار كبير للطحالب وتوفر المواد العضوية فيها ويرجع ذلك إلى وجود تسرب لمياه الصرف الصحي في البحيرة، كما تم التأكد من التنوع البيولوجي في المنطقة من خلال العديد من الدراسات

الطيور مما أدى إلى اختلاف كبير في الأنواع التي تتراد المنطقتين حيث أن الأنواع التي ميزت منطقة قنفوذة أغلبها من النوارس وباقي الأنواع التي تفضل المناطق التي بها قمامة، أما في جليانه ووجود بيئات مختلفة من حيث العمق، والغطاء النباتي وما تحويه من أماكن للاختباء والحماية فنجد أن بها أنواع كثيرة تعكس هذه البيئات وقد انفردت بعدد 61 نوع، وهذا يرجع إلى عامل التفضيل لدي الطيور من حيث البيئة ووفرة الغذاء. (Jones, 2001)

تؤثر الاختلافات في عمق المياه على الطيور، وتركيبية الأنواع، ووفرة النباتات الناشئة والمغمورة في الأراضي الرطبة (Robel, 1961) كذلك تؤثر النباتات بدورها على كمية الغذاء المتاح، والتكاثر والغطاء الحراري لطيور المستنقعات والطيور المائية (Robel 1961; Murkin *et al.*, 1997)، كما يمكن أن يؤثر عمق المياه أيضاً على مجموعات اللاقاريات، والتي توفر مصدراً غذائياً مهماً للطيور المائية (Murkin and Kadlec, 1986; Cox *et al.*, 1998).

الأنواع المهددة بالانقراض:

سجلت هذه الدراسة 21 نوعاً مهدداً بالانقراض، وهذا التسجيل يُضفي طابعاً من الأهمية البيئية على المناطق التي سجلت فيها هذه الأنواع المهددة، مما يجعلها مناطق مهمة للتنوع الحيوي وخاصة للطيور (Birdlife International, 2009) أن تواجد مثل هذه الأنواع بمناطق الدراسة بالإضافة إلى الأهمية البيئية للمواقع فإنه يعطي المبرر لحماية هذه المناطق وأعلان المنطقة كمحمية طبيعية، حيث تم تسجيل 13 نوعاً منها وردت بالقائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN-Redlist) والتي تعد مرجعاً عالمياً يتم الاستدلال به في التعرف على الأنواع المهددة بالانقراض. تسعة أنواع ورد ذكرها بالملاحق الثاني الصادر عن مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (RAC/CPA-Annex II) كأنواع مهددة بمنطقة المتوسط، والاهتمام بالأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على البيئات التي تترادها ربما يؤدي إلى زيادة أعدادها وتفاذي خطر الانقراض وهذا ما يهدف له العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والعامة في مجال حماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.

المراجع:

- Azafzaf, H., Baccetti, N., du Rau, P. D., Dlensi, H., Essghaier, M. F., Etayeb, K., Hamza, A. and Smart, M. 2005. Report on an Ornithological Survey in Libya from 3 to 17 January 2005. Cyclostyled report to Regional Activities Centre/Special Protected Areas (MAP/UNEP), Environment General Agency (Libya) and African-Eurasian Waterbird Agreement (UNEP/AEWA).
- Azafzaf, H., Baccetti, N., du Rau, P. D., Dlensi, H., Essghaier, M. F., Etayeb, K., Hamza, A. and Smart, M. 2006. Report on an Ornithological Survey in Libya from 19 to 31 January 2006. Cyclostyled report to the Regional Activity Centre/Special protected Areas (MAP/UNEP), Environment General Agency, Libya and to the African-Eurasian Waterbird Agreement (UNEP/AEWA).

المهاجرة خلال هذا الفصل هي الطيور المائية أو باعتباره موسم حركة وهجرة للطيور المائية (Etayeb *et al.*, 2023; EGA-RAC/SPA, 2012).

بالمقابل نجد أن فصل الشتاء قد انفرد بوفرة عالية جداً ويفارق معنوي مقارنة بباقي الفصول وهذا يفسر ما يسمى بالسيادة وهي أنواع ممتلئة بأعداد كبيرة بحيث كانت أنواع النوارس التي تهاجر شتاءً تأتي بأعداد كبيرة مما أدى إلى انفرد هذا الفصل بوفرة عالية وهذه النتائج تتوافق مع نتائج المسح الشتوي (2005-2010)، المقام سنوياً خلال شهر يناير منذ بداية الدراسات سنة 2005، حيث يتم تسجيل الآلاف من أفراد الطيور المائية الشتوية في ليبيا-EGA (RAC/SPA, 2012; Bourass *et al.*, 2013; Etayeb *et al.*, 2015)

فيما يتعلق بالتنوع خلال الفصول بين المناطق، فنجد في منطقة جليانه أن أعلى تنوع كان في فصل الخريف ويليه فصل الصيف، وهذا يعود إلى موسم الهجرة الذي يبدأ من أواخر الصيف إلى منتصف أغسطس، وهذا يعكس الاختلافات الموسمية في هجرة الطيور (Nilsson *et al.*, 2013). أما أعلى وفرة في منطقة جليانه كانت في فصل الربيع ربما هذا يعكس مدي التنوع البيئي والنباتي لمنطقة جليانه وازدهار هذه العوامل في فصل الربيع وأغلب الأنواع تبحث عن الملجأ والمكان المناسب للتعشيش (الغطاء النباتي التي تميز منطقة جليانه)، وأظهرت دراسة أجريت في مساحة خضراء عامة أن ثراء أنواع الطيور يزداد بزيادة مساحة المساحة الخضراء (Chamberlain *et al.*, 2007). كما وجد الباحثون ارتباطات كبيرة بين تنوع الأشجار وكثافتها وثراء الطيور ووفرته، وكشفت هذه الدراسة أيضاً عن وجود علاقة إيجابية بين تنوع الطيور وثرثاء النباتات الزهرية (Blinkova and Shopova., 2017) حيث يؤثر حجم وكثافة النباتات في المناطق الحضرية بشكل إيجابي على ثراء وتنوع الطيور فيها (Savard *et al.*, 2007; Mela and Loutit, 2000; Sepp *et al.*, 2018) إلى أن الطيور تفضل التعشيش بالمناطق الشجرية، حيث تبحث الطيور بنشاط عن مواقع تعشيش مناسبة وتطور استراتيجيات تكاثر مثالية لبقائها وازدهارها في المدن. توفر المساحات الخضراء الحضرية ظروف معيشية مقبولة للطيور من خلال توفير الملجأ المناسب وموارد الغذاء الوفيرة ومناطق التعشيش مع انخفاض المنافسة والافتراض (Magre *et al.*, 2019).

بحيرة 23 يوليو تميز فيها أيضاً فصل الخريف بأكثر تنوع أما الوفرة كانت في فصل الشتاء لأن المنطقة تعتبر بحيرة عميقة، وترتادها أنواع النوارس والتي هجرتها في فصل الشتاء وهذا يعكس الأعداد الكبيرة للنوارس بالمنطقة وكذلك من خلال الدراسات السابقة تم تسجيل نتائج مشابهة (Azafzaf *et al.*, 2005, 2006; Etayeb *et al.*, 2007; Hamza *et al.*, 2012; EGA-RAC/SPA, 2017)، أما من حيث تواجد الأنواع بنفس الوفرة العددية خلال فصل الخريف هذا ربما يرجع إلى بداية توافد أعداد من النوارس على هيئة مجموعات إلى الساحل الليبي خلال الهجرة الخريفية، وفي المقابل نجد الوفرة غير متجانسة في باقي الفصول وذلك ربما يرجع إلى اختلاف مواعيد هجرة العودة لهذه الأنواع (Bourass *et al.*, 2013; Etayeb *et al.*, 2023). بالنسبة لمنطقة قنفوذة كما تم الإشارة لها بأنها بيئة سبخية ويوجد بها مكب للنفايات وخلال فصل الشتاء مع هجرة الطيور المائية تتوافد العديد من أنواع النوارس وطائر الزرزور الشائع *Sturnus vulgaris* وهذا يعكس العدد الكبير للتنوع والوفرة في الشتاء ويفارق معنوي عن باقي الفصول، حيث في سنة 2006 تم تعداد من النوارس في منطقة الشتاء قنفوذة وهو الموقع الوحيد الذي يؤوي أعلى عدد من الطيور (EGA-RAC/SPA, 2012) وكذلك أشار التائب (Etayeb *et al.*, 2023) إلى ما مجموعه 15000 من النوارس منهم نورس أسود الرأس *Chroicocephalus redibundus* كما تم تسجيل أكثر من 9000 فرد من نورس أصفر الأرجل *Larus michahellis* بالمنطقة خلال شتاء 2022 وهذا يتوافق مع نتائج هذه الدراسة.

نتائج هذه الدراسة أوضحت أن أعلى تشابه كان بين منطقتي جليانه وقنفوذة ولكن نسبة التشابه تعتبر إلى حد ما ضئيلة 43 % وهذا يرجع إلى الاختلاف البيئي بين المنطقتين ومدى جذب

- Abdulmoula Hamza, Ehab Sharif, Abdunaser Dayhum, Abdulwahab Kammon and Ibrahim Eldaghayes. 2023. Results of the eighteenth winter waterbird census in Libya in 2022. *Open Veterinary Journal*, Vol. 13(4): 407–418.
Doi: <https://doi.org/10.5455/ovj.2023.v13.i4.2>
- Etayeb, K. S., Berbash, A., Bashimam, W., Bouzainen, M., Galidana, A., Saied, M., Yahia, J. and Bourass, E. 2015. Results of the eighth winter waterbird census in Libya in January 2012. *Biodiversity Journal*, 6 (1): 245–252.
- Etayeb, K., Essghaier, M. F., Hamza, A., Smart, M., Azafzaf, H., du Rau, P. D., and Dlensi, H. 2007. Report on an Ornithological Survey in Libya from 3 to 15 February 2007. Cyclostyled report to the Regional Activities Centre/Spl Protected Areas (MAP/UNEP) and Environment General Authority, Libya. 46pp.
- Etayeb, K., Yahya, J., Shomany, K., Algnaien, H., and Hamza, A. 2012. Report on restoration and extension of Lake Jeliana islet. Technical Report. Initiative PIM.
- Gaskell, J. 2005. Recent changes in the status and distribution of birds in Libya –Sandgrouse. 27(2): 126–138.
- Hamza, A., Baccetti, N., Sultana, J., Yahya, J., Zantello, M., Faveri, A., Cutts, N., Borg, J., Azafzaf, H., Defos, P. D. R., Bourass, E., Etayeb, K. and Elliott, M. 2017. Migration flyway of the Mediterranean breeding Lesser Crested Tern *Thalasseus bengalensis emigratus*, *Ostrich*, (4): 1–6.
Doi: <https://doi.org/10.2989/00306525.2016.1231139>.
- Birdlife International. 2009. Designing networks of marine protected areas: exploring the linkages between Important Bird Areas and ecologically or biologically significant marine areas: BirdLife International Cambridge, UK.
- Jones, J. 2001. Habitat selection studies in avian ecology: a critical review. *The Auk*. 118(2), 557– 562.
Doi: <https://doi.org/10.1093/auk/118.2.557>.
- Magre, J. M., Juncà, M. B., Campanera, J. M., Pagès, A. B., Mallén, I. R., Zaragoza, R. M., et al. 2019. How Baker, M. C. 1979. Morphological correlates of habitat selection in a community of shorebirds (Charadriiformes). *Oikos* 33: 121–126.
Doi: <https://doi.org/10.2307/3544520>.
- Blinkova, O., and Shupova, T. 2017. Bird communities and vegetation composition in the urban forest ecosystem: correlations and comparisons of diversity indices. *Ekológia (Bratislava)* 36 (4), 366–387.
Doi: <https://doi.org/10.1515/eko-2017-0029>.
- Bourass, E., Baccetti, N., Bashimam, W., Berbash, A., Bouzainen, M., De Faveri, A., Galidan, A. M. Saied, J. Yahia and Zenatello, M. 2013. Results of the seventh winter waterbird census in Libya, January–February 2011. *Bulletin of the African Bird Club*, 20, 20–26.
Doi: <https://doi.org/10.5962/p.309989>.
- Chamberlain, D. E., Gough, S., Vaughan, H., Vickery, J. A., and Appleton, G. F. 2007. Determinants of bird species richness in public green spaces. *Bird Study*, 54(1), 87–97.
Doi: <https://doi.org/10.1080/00063650709461460>.
- Cox Jr, R.R., Hanson, M.A., Roy, C.C., Euliss Jr, N.H., Johnson, D.H. and Butler, M.G., 1998. Mallard duckling growth and survival in relation to aquatic invertebrates. *The Journal of Wildlife Management*, pp.124–133. Doi: <https://doi.org/10.2307/3802270>.
- Defos, P.D.R., Essghaier, M.F.A. and Etayeb, K.S. 2001. Preliminary survey of coastal wetlands of Libya, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, France and Environment General Authority – Libya (report 1).
- EGA–RAC/SPA Waterbird Census Team. 2012. Atlas of Wintering Waterbirds of Libya, 2005–2010. Imprimerie COTIM, Tunisia.
- Abdulsamad, E. O., & Elbabour, M. M. 2018. Juliana Lake: A wetland in an urban environment. *Libyan Journal of Science & Technology*, 7(2), 65–72.
Doi: <https://doi.org/10.37376/ljst.v7i2.2241>.
- Etayeb, K., Ashraf Galidana, Ali Berbash, Adunnasser Eisa, Ali Al-kordi, Elias Al-Helali, Mahmoud Abuhajar, Abdulati Alswyeb, Hussien Abdulqader, Naders Azabi, Nader Ghriba, Saleh Deryaq, Abdulhafiz Algnaien, Saleh Buirzayqah, Murad Buijljayil, Muhanad Bujazlya, Abdulmajid Hamhoom,

- Samraoui, F., Alfarhan, A.H., Al-Rasheid, K.A., and Samraoui, B. 2011. An appraisal of the status and distribution of waterbirds of Algeria: indicators of global changes. *Ardeola* 58(1), 137–163.
Doi: <https://doi.org/10.13157/arla.58.1.2011.137>.
- Savard, J. P. L., Clergeau, P., and Mennechez, G. 2000. Biodiversity concepts and urban ecosystems. *Landscape Urban Plan.* 48 (3–4), 131–142.
Doi: [https://doi.org/10.1016/s0169-2046\(00\)00037-2](https://doi.org/10.1016/s0169-2046(00)00037-2).
- Sepp, T., McGraw, K. J., Kaasik, A., and Giraudeau, M. 2018. A review of urban impacts on avian life–history evolution: Does city living lead to slower pace of life? *Global Change Biol.* 24 (4), 1452–1469.
Doi: <https://doi.org/10.1111/gcb.13969>.
- Shannon, C. E., and Weaver, W. 1949. The mathematical theory of communication. University of Illinois Press, Urbana 117p.
- Simpson, E. H. 1949. Measurement of diversity. *Nature*.
Doi: <https://doi.org/10.1038/163688a0>
- Smart, M., Essghaier, M. F., Etayeb, K., Hamza, A., Azafzaf, H., Baccetti, N. and Defos du Rau P. 2006. Wetlands and wintering waterbirds in Libya, January 2005 and 2006. *Wildfowl and Wetlands Trust.* 56: 172–191.
- Svensson, L., Mullarney, K., and Zetterström, D. 2009. *Collins Bird Guide* (2nd ed.). HarperCollins, London
- Weiser, E. L., and Powell, A. N. 2011. Reduction of garbage in the diet of nonbreeding glaucous gulls corresponding to a change in waste management. *Arctic*, 64(2), 220–226.
Doi: <https://doi.org/10.14430/arctic4101>
- urban green management is influencing passerine birds' nesting in the Mediterranean: A case study in a Catalan city. *Urban For. Urban Gree.* 41, 221– 229.
Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.03.012>.
- Mella, J. E., and Loutit, A. 2007. Ecología comunitaria y reproductiva de aves en cerros islas y parques de Santiago. *Boletín Chileno de Ornitología*, 13, 13–27.
- Murkin, H. R. and J. A. Kadlec. 1986. Relationships between macroinvertebrates densities and waterfowl in a northern prairie marsh. *Journal of Wildlife Management* 50: 212–217.
Doi: <https://doi.org/10.2307/3801899>.
- Murkin, H. R., E. J. Murkin and J. P. Ball. 1997. Avian habitat selection and prairie wetland dynamics: a 10-year experiment. *Ecological Applications* 7: 1144–1159. Doi: <https://doi.org/10.2307/2641203>.
- Nilsson, C., Klaassen, R. H., and Alerstam, T. 2013. Differences in speed and duration of bird migration between spring and autumn. *The American Naturalist*, 181(6), 837–845.
Doi: <https://doi.org/10.1086/670335>
- Poysa, J. 1983. Resource utilization pattern and guild structure in a waterfowl community. *Oikos* 40:295–307. Doi: <https://doi.org/10.2307/3544594>.
- Ramsar Convention Secretariat. 2024. Wetland classification system. <https://www.ramsar.org>
- Robel, R. J. 1961. Water depth and turbidity in relation to growth of Sago Pondweed. *Journal of Wildlife Management* 25: 436–438.
Doi: <https://doi.org/10.2307/3798837>.